

dentindentendentendentend

OMtp2

Date: 2 2014
Personne: 2
Nb feuille: 5

Taïfi rosovy
Abdukiaki

Vass8R05s196-200







dantiidaataalaataalaataa)

Juntumlumta

ANNEE 1988 NOM Abdukiaki

Luntumlenti

EMPLACEMENT 8 R5 1 196.200

mi.

Souche	Nbre yeux		rrement mi/đéb		Ferti- lité		raisor mi/f		Vé début	raison mi/v	Maturité
2 3 4 5 5		28.3 Pourri	1.4 1.4 1.4		O Port :/	ni onge	Vi	Jueur	: 1,5 fo	ibli	

NOM Abdukiaki

EMPLACEMENT 8 R5, 196, 200

Nore Débourrement Nore Ferti-Floraison Véraison début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

 7

 3

 4

 5
 2

 83
 133.00

Pourriture : Mill. :

Port: mi enge

Vigueur: 2

D 6 43 - 3 .89 - 5

ANNEE 1990

NOM Abdukiaki

EMPLACEMENT 8 R5 A 196. 200

daininduntanlaataal

wi

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fle début	raiso mi/f	Vé début	raisor mi/v		Maturité
2 3 1		1	1,3 ×	0 (-8)	0						
Pourriture :			Mi	ill. :		Port :		Vic	gueur	1	

ANNEE 1991 NOM Abdukiaki mi

EMPLACEMENT 8 Rg 5 A 196. 200

		/**							
Souche	Nore	Débourrement Mbre début mi/déb grap	Ferti-	Floraison début, mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
2 2 3 5 5	2	0	Four : Baie : Couleu Saveur	# G - M - P Mil. TG - G - M - disc-sph-el. # : 3-Gr-Rs-1 : s - m - a: : avec - ap: eu ge	l: - P D: l-ov-(Rg-N r - fo	im : obov-cy Jus ox - he	vl-fus : inc		

ANNEE: 1996 EMPLACEMENT 8 R5 A136 200 HOM Abdukiaki Ob. 228.79 Whre Débourrament Uhice yeux début mi/déb grap Ferti- Ploraison Véraison 1166 debut mi/f [fin debut mi/v fin Datur 116 8,2 15.2 0 2 y Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - H- C Four: Mill: Baie: Te - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herbPépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :

Juntumlento

N° d'ordre :

Désignation :

Abdukiaki 018 R5 s 196-200 (5.200) Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189

cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - a plages bronzées ou cuivrées 196) - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198).

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

donton harten bartan harten b

Etallées - en gouttlière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202) - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 (à plages bronzées ou cuivrées 2/10 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 17 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 26 legt 4: duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 de legété duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285. A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - a plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 2(33).

A pétiole glabre 2(34) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Abdukiaki 8 R 5 s. 196-200 (2.5)

dantanlaataalaataalaataal

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 25/ - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 vert 265. Courgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

Nº d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Abdukiakí 8 R5 s- 196-200 (s.5)

dantadantadantadanlaring

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172.

Glabre 1(3) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 88

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année

Juntumburd

Observateur

Code cepage ~~ Nom cepage Abdukiaki

Code clone

Emplacement: 8 RS 196.200

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique & - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre @ - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles absentes D- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des nocuds : absence P - présence 9.

oiv 100 densité des poils dressés des entrenoeuds absence D- présence 9

orv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) $\mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ courts (90mm) (-4 moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 354 diamètre entrenoends : très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (11mm) \$5-grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9

Vig 3/5

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyeu 5 - elevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve 1 très élevé 9

Vassal

Noends aplatis I moyens 4 - sadlants 3